

Referencia:	FC/TEC-0004
Versión n.º:	6
Vigencia:	09/05/2020
Próxima revisión:	09/05/2025
Fase:	Vigente

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: BIO-COCCIVET R - VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA COCCIDIOSIS

LUGAR DE APLICACIÓN: Asuntos Regulatorios; Control de Calidad; Garantía de la Calidad

Nº LICENCIA MAPA	9.065/2005 el 05/04/2005				
NOMBRE COMERCIAL	BIO-COCCIVET R				
DESCRIPCIÓN	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA COCCIDIOSIS AVIAR PARA REPRODUCTORAS Y PONEDORAS COMERCIALES				
COMPOSICIÓN	La Vacuna contra Coccidiosis Aviar fabricada por el Laboratorio Biovet está constituida de una suspensión viable de las siguientes Eimerias: <i>E. acervulina</i> , <i>E. brunetti</i> , <i>E. maxima</i> , <i>E. necatrix</i> , <i>E. praecox</i> , <i>E. tenella</i> y <i>E. mitis</i> , aisladas de campo en Brasil y multiplicadas en aves.				
INDICACIÓN	Aves reproductoras y ponedoras comerciales				
MODO DE USO	<p>1) La vacuna se puede administrar por vía ocular o nasal, a través de instilación: La vacuna se presenta en 30mL y aplica en gotas de 0,03mL en el ojo o en la nariz, utilizando el bocal cuentagotas. Este método de aplicación garantiza que todas las aves del mismo lote reciban, uniformemente, la dosis recomendada. Se recomienda que la aplicación vía ocular o nasal se haga concomitantemente con el corte del pico de las aves (3 a 8 días de edad).</p>				
	ESQUEMA DE VACUNACIÓN OCULAR / NASAL				
	Vacunación	Edad de las aves	Nº de aves	Dosis de vacuna	Volumen Final
	Vacunación única	3 a 8 días	1.000	1.000	30 mL
	<p>2) La aplicación se puede realizar vía spray, con la vacuna diluida de tal forma que garantice que todas las aves del mismo lote reciban, uniformemente, la dosis recomendada. Esta forma de administración está recomendada para aves con un día de edad y se debe realizar en la propia incubadora. Se deben observar cuidados con la calidad del agua, suspensión de medicamentos y desinfectantes 72 horas antes y 24 horas tras la vacunación, entre otros.</p>				
	ESQUEMA DE VACUNACIÓN SPRAY				
	Vacunación	Edad de las aves	Nº de aves	Dosis de vacuna	Volumen Final

FECHA DE CREACIÓN:	07/05/2020	FECHA DE REVISIÓN:	08/05/2020	FECHA DE APROBACIÓN	08/05/2020
EMITIDO POR:	João Luis Revolta Callefe	REVISADO POR:	Erika Hiromi Seike	APROBADO POR:	Danillo Silva Marcon

Referencia:	FC/TEC-0004
Versión n.º:	6
Vigencia:	09/05/2020
Próxima revisión:	09/05/2025
Fase:	Vigente

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: BIO-COCCIVET R - VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA COCCIDIOSIS

LUGAR DE APLICACIÓN: Asuntos Regulatorios; Control de Calidad; Garantía de la Calidad

	Vacunación única	1 día	1.000	1.000	210 mL
RECOMENDACIONES	-No vacunar aves mal nutridas, débiles o con enfermedades intercurrentes (coriza, salmonelosis, DCR y otras), porque son más sensibles y no responden satisfactoriamente a la inmunización; - Evitar condiciones de estrés ambiental durante la vacunación.				
OBSERVACIONES	-Las partidas de vacuna se producen cuidadosamente y pasan en el Laboratorio por todos los ensayos de control de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. Los resultados satisfactorios de esta vacuna dependen de su conservación, manejo y modo de administración, así como del estado sanitario de las aves. -La vacuna produce inmunidad sólida entre 14 y 35 días tras su aplicación y su duración es para toda la vida. -MANTENER ESTE Y CUALQUIER MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS				
EFFECTOS COLATERALES	Es posible, pero improbable, que suceda una reacción post vacunal exacerbada con aproximadamente 12 días tras la vacunación, normalmente si las condiciones de manejo son deficientes. En caso de que suceda eso, entrar con medicación anticoccidiana para las aves.				
IMPORTANTE	-NO ADMINISTRAR BIO-COCCIVET R CONCOMITANTEMENTE CON DROGAS ANTICOCCIDIANAS. - La vacunación se debe realizar en las horas más frescas del día, de preferencia por la mañana. -Después de abierto el frasco de la vacuna, desechar el contenido que no se haya utilizado. Todas las aves susceptibles de un plantel se deben vacunar al mismo tiempo. Si esto no es posible, las no vacunadas se deben mantener bajo estricta separación.				
PRESENTACIÓN	El producto se presenta en frascos de plástico conteniendo el volumen de 30ml de una suspensión concentrada de Eimerias en la forma de ooquistes esporulados y vivos, correspondientes a 1.000 dosis, prontos para uso. Los frascos de vacuna se acondicionan en número de 10, envueltos por un embalaje de material plástico BOPP con sistema de cierre <i>flow pack</i> que garantiza el aislamiento total a la humedad, acompañados de los respectivos prospectos del producto y de los bocales cuentagotas.				
CONSERVACIÓN	La vacuna se debe conservar a temperatura entre 2 °C y 8 °C.				
PLAZO DE VALIDEZ:	12 (doce) meses tras la fecha de fabricación.				

FECHA DE CREACIÓN:	07/05/2020	FECHA DE REVISIÓN:	08/05/2020	FECHA DE APROBACIÓN:	08/05/2020
EMITIDO POR:	João Luis Revolta Callefe	REVISADO POR:	Erika Hiromi Seike	APROBADO POR:	Danillo Silva Marcon

Referencia:	FC/TEC-0004
Versión n.º:	6
Vigencia:	09/05/2020
Próxima revisión:	09/05/2025
Fase:	Vigente

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: BIO-COCCIVET R - VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA COCCIDIOSIS

LUGAR DE APLICACIÓN: Asuntos Regulatorios; Control de Calidad; Garantía de la Calidad

RESPONSABLE TÉCNICO	DANILLO SILVA MARCON CRMV-SP 36.982
CONTACTO COMERCIAL	SAC: 0800 55 6642 TEL (PABX): (11) 4158-8200 E-mail: sac@biovet.com.br
PROPIETARIO	Laboratório Bio-Vet Ltda. Estrada São Roberto, 306 CEP 18150-000 Sorocamirim, Ibiúna-SP. CNPJ [Registro Nacional de Persona Jurídica]: 60.411.527/0010-21 INDUSTRIA BRASILEÑA
FABRICANTE	Laboratório Bio-Vet Ltda. Estrada São Roberto, 306 CEP 18150-000 Sorocamirim, Ibiúna-SP. CNPJ [Registro Nacional de Persona Jurídica]: 60.411.527/0010-21 INDUSTRIA BRASILEÑA

FECHA DE CREACIÓN:	07/05/2020	FECHA DE REVISIÓN:	08/05/2020	FECHA DE APROBACIÓN:	08/05/2020
EMITIDO POR:	João Luis Revolta Callefe	REVISADO POR:	Erika Hiromi Seike	APROBADO POR:	Danillo Silva Marcon