



FORTEGRA® Ficha técnica

Vacuna contra coccidiosis para pollos que contiene oocistos vivos de *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria maxima* MFP, *Eimeria mivati* y *Eimeria tenella*

Composición

Cada dosis de vacuna contiene:

Eimeria acervulina	≥ 600 Oocistos,
Eimeria máxima	≥ 200 Oocistos,
Eimeria máxima MFP	≥ 100 Oocistos,
Eimeria mivati	≥ 400 Oocistos
Eimeria tenella	≥ 200 Oocistos.

Forma farmacéutica:

Suspensión para la administración por aspersión.

Indicaciones

Para la vacunación de pollos saludables de un día de edad, mediante la administración por aspersión en cabina, como ayuda en la prevención de la coccidiosis provocada por *E. mivati* y *E. tenella*, como una ayuda en la reducción de lesiones relacionadas con *E. acervulina* y *E. maxima*.

Dosis y Vía de Administración

Administración por aspersión en cabina.

La vacuna debe ser preparada (o mezclada) en una proporción de 210 ml de agua destilada por 1000 dosis de vacuna.

Cada 100 pollos deben de recibir 21 ml de solución de vacuna, administrada por aspersión en cabina.

Tiempo de retiro

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

Almacenamiento:

Almacénese entre 2 y 7°C. No se congele.

Precauciones

Agítese bien antes de aplicar.

Utilizar todo el contenido cuando se abra por primera vez.

Esta vacuna contiene gentamicina como agente conservador.



Presentación

Frascos x 1000 dosis y 10000 Dosis.

Fabricado por:

Intervet Inc., USA.

Importado por:

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA
Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

REGISTROS:

Costa Rica: US27-98-7-5958

El Salvador: VE2019035543

Honduras: PB-858

Nicarágua: 11012

Venezuela: INSAI2041PI34N057234

