



F VAX-MG® Ficha técnica

Vacuna contra *Mycoplasma gallisepticum*.

Composición

Cada dosis una vez reconstituida contiene:

Mycoplasma gallisepticum cepa F: $\geq 106,0$ CCU50/dosis

La vacuna contiene penicilina (≤ 30 U/ml) como preservativo/remanente de producción.

Forma farmacéutica:

Vacuna liofilizada.

Indicaciones

Para administrar por aspersión a pollas sanas de nueve o más semanas de edad, como ayuda en la prevención de los signos clínicos asociados con la infección por *Mycoplasma gallisepticum*.

Dosis y Vía de Administración

Aplicar por aspersión en rociado grueso un frasco reconstituido en 30 mL de agua destilada y mezclado posteriormente en 300 mL de agua destilada por cada 1000 aves.

Tiempo de retiro

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR - Protéjase de la luz.

Precauciones

No administrar una semana antes ni una semana después de administrar vacunas vivas de Newcastle, Bronquitis o Laringotraqueitis.

No permitir el contacto de pavos con el producto ni con pollas ya vacunadas

No administrar 3 días antes ni 7 días después de tratamiento con oxitetraciclina, clortetraciclina y/o sulfonamidas.

Presentación

Frascos x 1000 dosis.

Fabricado por:

Intervet Inc.
USA.



Importado por:

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA
Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

REGISTROS:

Costa Rica: US-3-65-64-1450

El Salvador: 99-08-1863

Guatemala: US237-65-64-5273

Honduras: PB-403

Nicaragua: 5164

Panamá: RB-94-09

República Dominicana: 3482

Venezuela: MPPAT-SASA B.I. 7541

