



## NOBILIS® CORVAC 4 Ficha técnica

---

**Inmunización activa de pollas para reducir la infección y los signos clínicos causados por *Avibacterium paragallinarum*.**

---

### **Composición**

Por dosis de 0,5 mL:

A. paragallinarum

- Cepa 083 (serotipo A) al menos 1 DPP70\*
- Cepa Spross (serotipo B) al menos 1 DPP70
- Cepa H- 18 (serotipo C) al menos 1 DPP70
- Cepa 48 (serotipo variante tipo B) al menos 1 DPP70

\* Dosis protectora del 70% de los pollos

### **Forma farmacéutica:**

Emulsión acuosa.

### **Indicaciones**

En gallinas comerciales y reproductoras para reducir la infección y signos clínicos causados por *Avibacterium paragallinarum*.

### **Dosis y Vía de Administración**

Inyectar 0,5 mL de vacuna por vía subcutánea a pollas de tres semanas en adelante y se repite la vacunación antes de la puesta.

El intervalo mínimo entre las vacunaciones debe ser de 6 semanas.

### **Tiempo de retiro**

No requiere (0 días)

### **Almacenamiento:**

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR - Protéjase de la luz.

### **Precauciones**

Deseche el frasco y remanentes de vacuna mediante incineración.

No utilizar en las aves durante el periodo de postura.

### **Presentación**

Frasco de 500 ml (1000 dosis)

### **Fabricado por:**

Intervet International B.V.

Holanda



**Importado por:**

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA  
Bajo Licencia de Intervet International B.V.

**Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.**

**Venta bajo receta médica.**

**Uso veterinario**

**REGISTROS:**

Costa Rica: NL-4-65-56-3275

El Salvador: VE2006013351

Guatemala: NL94-65-56-758

Honduras: PB-610

Nicaragua: 9703

Panamá: RB-424-10

República Dominicana: 7944

