



NOBILIS® CORVAC

Ficha técnica

Vacuna inactivada contra infecciones por *Avibacterium paragallinarum* en aves.

Composición

Cada dosis (0.5 ml) contiene:

Avibacterium paragallinarum:

Cepa 083 (Serotipo A)	1CPD*70
Cepa Spross (Serotipo B)	1CPD*70
Cepa H18 (Serotipo C)	1CPD*70

Forma farmacéutica:

Emulsión acuosa.

Indicaciones

Vacunación contra infecciones por *Avibacterium paragallinarum* en pollos. Los pollos se vacunan con el fin de simular la protección homóloga (específica por serotipo) contra el tipo de cepas incorporadas en la vacuna.

Dosis y Vía de Administración

Inyectar, por vía subcutánea, 0.5 ml de vacuna en aves de postura y reproductoras de 5 a 10 semanas de edad y revacunar pocas semanas antes del inicio de la postura. Debe haber un intervalo entre la vacunación de por lo menos 6 semanas.

Para alcanzar una protección en aves de postura y reproductoras de más de 60 semanas de edad se requieren dos vacunaciones. Para alcanzar una protección en aves de postura y reproductoras de más de 60 semanas de edad se requieren dos vacunaciones.

Tiempo de retiro

No requiere (0 días)

Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR - Protéjase de la luz.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Presentación

Botella PET multidosis de 500 ml para 1000 dosis.

Fabricado por:

Intervet International BV
Holanda





Importado por:

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA
Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

REGISTROS:

Costa Rica: NL-4-65-56-4298

Guatemala: NL94-65-82-1263

Nicaragua: 9939

Panamá: RB-416-10

República Dominicana: 5126

