



NOBILIS® IB MA5

Ficha técnica

Vacuna viva liofilizada contra Bronquitis infecciosa aviar.

Composición

Cada dosis de la reconstituida contiene:

Virus de Bronquitis infecciosa, cepa MA5 $10^{3,0}$ DIE_{50}

Forma farmacéutica:

Vacuna viva liofilizada.

Indicaciones

Inmunización de pollos sanos frente al serotipo Massachusetts de Bronquitis infecciosa aviar.

Dosis y Vía de Administración

Se administra una dosis de al menos $3,0 \log_{10} DIE_{50}$ por ave en el agua de bebida, por vía ocular o nebulización.

La vacuna puede utilizarse a partir de 1 día de edad en cualquiera de las categorías de las especies de destino.

El volumen requerido para cada administración depende del equipo utilizado y de la edad de las aves que se van a vacunar.

Volúmenes requeridos calculados en base a 1000 dosis de vacuna:

Administración en el agua de bebida: disolver 1000 dosis de vacuna en tantos litros de agua como la edad de las aves en días, hasta un máximo de 40 litros. Emplear agua fresca y limpia, no clorada ni ferruginosa. Para mejorar la estabilidad de la solución vacunal puede añadirse leche desnatada en polvo (0,3%). Para la vacunación de lotes grandes se recomienda hacerlo en grupos para utilizar siempre solución vacunal fresca. Los viales deben abrirse bajo el agua o añadir el contenido de la(s) cápsula(s) al agua. En ambos casos, mezclar bien el agua que contiene la vacuna antes de usar. Después de la reconstitución, la suspensión debe aparecer clara. Privar a las aves del agua de bebida durante las 2 horas anteriores a la vacunación, para conseguir que la vacuna se consuma en un período inferior a 2 horas.

Administración por vía ocular: disolver 1000 dosis de vacuna en 31,5 ml del disolvente suministrado para administración ocular.

Administrar la vacuna mediante el cuentagotas suministrado. Instilar una única gota en una fosa nasal o en un ojo, desde unos cm de distancia. Asegurarse de la inhalación de la gota cuando se realiza la instilación nasal.

Administración por nebulización: disolver 1000 dosis de vacuna en 250-400 ml de agua.

Los viales deben abrirse bajo el agua o añadir el contenido de la(s) cápsula(s) al agua. En ambos casos, mezclar bien el agua que contiene la vacuna antes de usar. Después de la reconstitución, la suspensión debe aparecer clara. Administrar mediante nebulización de gota gruesa sobre el número de aves que corresponda a una distancia de 40-60 cm de las



aves, preferiblemente cuando estén juntas y lejos de la luz directa o cualquier otro foco de calor.

Tiempo de retiro

No tiene tiempo de retiro.

Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR - Protégase de la luz.

Presentación

Frascos de 500, 1000, 2500, 5000 y 10000 dosis.

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Boxmeer – Países Bajos.

Importado por:

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA
Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

REGISTROS:

Costa Rica: DE-3-7-28-1769
El Salvador: VE2015025035
Guatemala: DE385-42-01-4093
Honduras: PF-589
Nicaragua: 9903
Panamá: RF-82-11
República Dominicana: 4063
Venezuela: INSAI2041PI33N074564

