



NOBILIS® ND C2

Ficha técnica

Vacuna liofilizada para la inmunización de pollos contra la enfermedad de Newcastle.

Composición

Cada dosis contiene:

Virus de la enfermedad de Newcastle vivo atenuado, cepa C2 $\geq 5,7 \log_{10}$ D_{IE} 50

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Forma farmacéutica:

Vacuna Liofilizada para reconstituir.

Indicaciones

Para la inmunización activa de pollos de un día de edad o más, a fin de reducir los signos clínicos y la mortalidad causados por el virus de la Enfermedad de Newcastle.

Dosis y Vía de Administración

La vacuna se puede administrar por instilación ocular o nasal o por pulverización a pollos de 1 día de edad en adelante mediante aplicación ocular/nasal o por nebulizador.

Administrar 1 dosis de al menos 5,7 log 10 EID₅₀ por animal.

Debido a la naturaleza suave de la cepa C2 de la Vacuna, esta es adecuada para la vacunación desde el primer día de vida en adelante y se recomienda revacunar después de 2 o 3 semanas con una vacuna lentogénica NDV a virus vivo para aumentar la inmunidad

Tiempo de retiro

No requiere (0 días).

Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. NO CONGELAR - Protégase de la luz.

Presentación

Frascos con 500, 1000, 2500, 5000, 10.000 o 25.000 dosis.

Fabricado por:

Intervet International BV
Holanda



Importado por:

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

REGISTROS:

Costa Rica: NL-4-65-63-3734

El Salvador: VE2019025531

Guatemala: NL94-65-63-4140

Honduras: PB-750

Nicaragua: 9759

Panamá: RB-648-16

República Dominicana: 9039

Venezuela: MPPAT_SASA B.I.12.706

