



NOBILIS® REO INAC

Ficha técnica

Vacuna inactivada para la inmunización de gallinas ponedoras frente a la Artritis viral o Tenosinovitis.

Composición

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Sustancia activa:

Reovirus aviar inactivado cepa 1733 y 2408: $\geq 7,4 \log_2$ unidades ELISA*

Forma farmacéutica:

Emulsión inyectable

Indicaciones

La vacuna se recomienda para la vacunación de gallinas ponedoras y reproductoras para protegerlas frente a la Artritis viral o Tenosinovitis.

Dosis y Vía de Administración

Se deben administrar 0,5 ml de vacuna por vía intramuscular en el muslo o en la pechuga o por vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

Nobilis® Reo Inac se administra entre las 16 y 20 semanas de edad, pero nunca durante las 4 semanas previas al comienzo de la postura.

Para un efecto óptimo de la dosis de refuerzo, las aves deben ser vacunadas previamente con la vacuna viva contra reovirus aviar.

Los mejores resultados se obtienen cuando la vacuna inactivada se administra al menos 6 semanas después de la vacuna viva, pero en ningún caso debe administrarse durante las 4 semanas siguientes a la primovacunación.

Tiempo de retiro

No requiere (0 días).

Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR - Protégase de la luz.

Precauciones

Los frascos deben usarse en las 3 horas posteriores a su apertura.

Justo antes de usar permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (20-25°C).

Agitar bien la botella antes de usar.

Presentación

Frascos de 500 ml suficientes para 1.000 dosis.



Fabricado por:

Intervet International B.V.
Holanda

Importado por:

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA
Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Venta bajo receta médica.

Uso veterinario

REGISTROS:

Nicaragua: Reg. N° 12234

