



NOBILIS® RT INAC / NOBILIS® TRT INAC

Ficha técnica

Vacuna inactivada para la protección de pollas contra la Rinotraqueítis.

Composición

Cada dosis de 0.5 ml contiene ≥ 100 EU del virus de la Rinotraqueítis aviar (ARTV), inactivado, en emulsión agua en aceite.

Forma farmacéutica:

Emulsión oleosa.

Indicaciones

En pollas de 16 a 20 semanas de edad para la prevención de la Rinotraqueítis causada por Neumovirus.

Dosis y Vía de Administración

Vía intramuscular o subcutánea 0.5 ml a las 16-20 semanas de edad.

Tiempo de retiro

No requiere (0 días)

Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR - Protéjase de la luz.

Precauciones

No aplicar 4 semanas antes del inicio de postura.

Las botellas abiertas deberán utilizarse dentro de las 3 horas posteriores a su apertura. NO combinar la administración de esta vacuna con otros productos.

Antes de aplicar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C). Agite antes de usar.

Presentación

Frascos de polietileno por 500 mL (1000 dosis)

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Holanda.

Importado por:

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA
Bajo Licencia de Intervet International B.V.



Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Venta bajo receta médica.
Uso veterinario

REGISTROS:

Costa Rica: NL-4-98-8-5820

Guatemala: NL94-65-91-5971

Honduras: PB-791

Nicaragua: 10384

Venezuela: INSAI 2041PI34N0714999

